

Valmistaja: BioKymppi Oy

Erätunniste: 2021

 Tuotteen kaupp nimi: **LuomuKymppi A**

Tyyppinimi: Määtysjäännös

Raaka-aineet: Erilliskerätty biojäte, kasvipohjaiset jätteet, kaupan entiset elintarvikkeet, teurasjäte (lk. 3) ja karjanlanta

 Pakkauskoko: Tuote toimitetaan irtotavarana
 Tilavuuspaino: 1000 kg/m³
 Johtokyky: 518 mS/m
 pH: 8,7
 Orgaaninen aines: 65,6 % Kuiva-aineesta
 Kosteus: 96,8 %
 Analysointi pvm: 2.2.2021

Pääravinteet:

	Kuiva-aineessa	Tuorepainossa
Kokonaistyyppi (N):	160 g/kg	5,0 kg/tn
Vesiliukoinen typpi (N):	103 g/kg	3,29 kg/tn
Laskennassa huomioitava typpipitoisuus (100% liukoinen typpi): 3,29 kg/tn		
Kokonaisfosfori (P):	13 g/kg	0,42 kg/tn
Vesiliukoinen fosfori (P):	5,2 g/kg	170 g/tn
Kokonaiskalium (K):	60 g/kg	1,9 kg/tn

Haitalliset metallit:

	Enimmäispitoisuus tuotteessa mg/kg ka	Sallittu pitoisuus Luomussa Komission asetus (EY) N:o 889/2008 mg/kg ka	Sallittu pitoisuus (MMA 12/07, muutos 19/09) mg/kg ka
Arseeni (As)	<5,3		25
Elohopea (Hg)	0,12	0,4	1,0
Kadmium (Cd)	0,29	0,7	1,5
Kromi (Cr)	9,5	70	300
Kupari (Cu)	51	70	600*
Lyijy (Pb)	<2,1	45	100
Nikkeli (Ni)	12	25	100
Sinkki (Zn)	180	200	1500*

*Ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä

Hivenravinteet:

	Kuiva-aineessa	Tuorepainossa
Magnesium (Mg), kokonaispit.	2,1 g/kg ka	0,07 kg/tn
Natrium (Na), kokonaispit.	38 g/kg ka	1,2 kg/tn
Rauta (Fe), kokonaispit	9,6 g/kg ka	310 g/tn
Rikki (S), kokonaispit.	6,9 g/kg ka	0,22 kg/tn
Boori (B), kokonaispit.	27 mg/kg ka	0,9 g/tn
Mangaani (Mn), kokonaispit.	250 mg/kg ka	8,0 g/tn

Karkeusaste:	Neste
Käyttötarkoitus:	Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannus aineena pelto- ja puutarhaviljelyssä.
Käyttöohje:	<p>Tuotteen käytössä on huomioitava nitraattiasetuksen ja ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset. Levitysjankohdan suhteen tuote rinnastetaan karjanlantaan.</p> <p>Typen laskennassa lannoitevalmisteen sisältämä liukoinen typpi otetaan kokonaan huomioon. Fosforin laskennassa ympäristökorvaukseen sitoutuneet ottavat huomioon kokonaisfosforista 60 prosenttia.</p> <p>Lannoite on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen ravinteiden huuhtoutumien estämiseksi.</p> <p>Tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen. 21 päivän varoaika koskee sekä laiduntamista että kasvuston niittämistä rehukäyttöön.</p>